

接種可能 時期	ワクチン名	回数	生・任(※)	備考	接種日	
生後2か月	ヒブ	1回目				
	肺炎球菌	1回目				
	B型肝炎	1回目		B型肝炎は1歳までに全3回を接種。2回目は1回目の4週間後、3回目は1回目から139日以上(およそ5か月)あけて接種		
	ロタ	1回目	生・任	ロタテックかロタリックスのどちらか一方を接種(病院によって選べたり、指定されたりする)。ロタテックは3回、ロタリックスは2回接種。どちらも生後104日までに初回接種が必要。		
上記より4週間あける						
生後3か月以降	ヒブ	2回目				
	肺炎球菌	2回目				
	B型肝炎	2回目		B型肝炎の3回目は、2回目から4か月あける		
	四種混合	1回目		または三種混合と不活化ポリオ		
	ロタ	2回目	生・任	ロタテックは3回目の接種が必要で、生後32週0日までに終える必要がある。 ロタリックスは2回接種で、生後24週0日までに終える必要がある		
	上記より4週間あける					
	ヒブ	3回目				
	肺炎球菌	3回目				
	四種混合	2回目		または三種混合と不活化ポリオ		
	ロタ	3回目	生・任	ロタテックは3回接種		
	上記より4週間あける					
	四種混合	3回目		または三種混合と不活化ポリオ		
	BCG	1回目	生	1歳未満までに1回接種		
	上記より4週間以上、 かつ1回目のB型肝炎より139日以上(およそ5か月)あける					
B型肝炎	3回目		B型肝炎の3回目は、1歳までに接種			
上記より1週間以上、 かつ3回目のヒブより7か月あける						
ヒブ	追加					
1歳以降	肺炎球菌	追加		肺炎球菌3回目の接種から60日あける		
	麻しん(はしか)・風しん混合	1回目	生			
	上記より4週間あける					
	みずぼうそう(水痘)	1回目	生			
	おたふく	1回目	生・任			
	上記より4週間以上、 かつ3回目の四種混合から1年あける					
	四種混合	追加		または三種混合と不活化ポリオ		
	上記より1週間以上、 かつ1回目のみずぼうそう(水痘)から1年あける					
みずぼうそう(水痘)	2回目	生				
3歳以降	日本脳炎	1回目				
	上記より1~3週間あける					
	日本脳炎	2回目				
	上記より1年あける					
	日本脳炎	追加				
	上記より1週間以上、 かつ1回目のおたふくから2~3年あける					
おたふく	2回目	生・任	2018年8月、日本小児科学会が推奨するスケジュールでは、2回目は次の「麻しん(はしか)・風しん混合」と同時期での接種(5歳以上7歳未満の小学校入学前の1年間(年長))を推奨			
上記より4週間あける						
小学校入学前の1年間(年長)	麻しん(はしか)・風しん混合	2回目	生	年長の3月末までに接種		